

### Chvátal tétele:

- 1) Ha egy  $n$  csúcsú  $G$  gráf  $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$  fokszámaira igaz, hogy amennyiben  $d_k \leq k < \frac{n}{2}$  akkor  $d_{n-k} \geq n - k$ , akkor  $G$  tartalmaz Hamilton-kört.
- 2) Ha a  $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$  pozitív egészekre a fenti feltétel nem teljesül, akkor van olyan Hamilton-kört nem tartalmazó gráf melynek  $d'_1 \leq d'_2 \leq \dots \leq d'_n$  fokszámaira  $\forall i d'_i \geq d_i$ .

*Bizonyítás:*

Az 1) állítás bizonyítása:

A bizonyítás az Ore-tétel bizonyításával azonosan indul: tegyük fel, hogy az állítás nem igaz, vagyis létezik olyan  $G'$  gráf, aminek fokszámai teljesítik a feltételt és mégisincs Hamilton-köre. Tekintsünk egy ilyen  $G'$ -t, és adjunk hozzá éleket mindaddig, amíg ez megtehető Hamilton-kör létrehozása nélkül. Az így kapott gráf legyen  $G$ .  $G$  továbbra is ellenpélda, hiszen nincs Hamilton-köre, a feltétel teljesülését pedig nem ronthattuk el az új élek hozzáadásával, hiszen attól a fokszámok csak nőttek.

Az Ore-tétel bizonyításakor elmondottak szerint:

-  $G$  bármely két összekötelen csúcsa között megy Hamilton-út, hiszen az említett két csúcs összekötésével csak így keletkezhet Hamilton-kör;

- Bármely két összekötetlen  $x$  és  $y$  csúcs  $d(x)$  és  $d(y)$  fokszámaira  $d(x) + d(y) \leq n - 1$ . (Ezt az Ore-tételnél indokoltuk: az  $x$  és  $y$  közötti Hamilton-úton  $x$  szomszédait megelőző pontok nem lehetnek szomszédai  $y$ -nak [máskülönben lenne Hamilton-kör], amiből  $d(y) \leq n - 1 - d(x)$ , ami a mondottal ekvivalens.)

Most jön az, ami új az Ore-tétel bizonyításához képest: válasszuk  $x$ -et és  $y$ -t úgy, hogy  $d(x) + d(y)$  a lehető legnagyobb legyen rájuk az összes összekötetlen csúcspár között. Tegyük fel még, hogy  $d(x) \leq d(y)$ . Az előbbiek szerint, ebből következik, hogy  $d(x) \leq \frac{n-1}{2} < \frac{n}{2}$ .

Jelöljük  $d(x)$ -et  $h$ -val. Megmutatjuk, hogy  $h$ -ra  $d_h \leq h < \frac{n}{2}$ . Ebből a második egyenlőtlenséget az előbb láttuk, tehát az elsőit kell csak bizonyítanunk. Ez avval ekvivalens, hogy  $G$ -nek van legalább  $h$  olyan csúcsa, aminek a fokszáma legfeljebb  $h$  (ekkor tehát a  $h$ -adik legkisebb fok nem lehet  $h$ -nál több,  $d_h \leq h$  pedig éppen ezt jelenti). Tekintsük  $x$  minden szomszédjához az  $x$  és  $y$  közötti Hamilton-út mentén őt megelőzőt. Már az Ore-tétel bizonyításánál láttuk, hogy ezek egyike sem lehet összekötve  $y$ -nal (mert lenne Hamilton-kör). Eszerint ezen összesen éppen  $h$  csúcs mindegyike választható lett volna  $y$  párjával a tekintett Hamilton-út kezdőpontjának, s ha bármelyiknek a fokszáma nagyobb volna  $x$ -énél, akkor  $d(x) + d(y)$  maximalizálásához valóban inkább ezt a csúcsot kellett volna választanunk. Mivel  $x$ -et választottuk, biztos, hogy ezen  $h$  darab csúcs egyikének sem nagyobb a foka  $x$  fokszámánál, vagyis  $h$ -nál. Tehát tényleg van legalább  $h$  darab  $h$ -nál nem nagyobb fokszámú csúcs, vagyis  $d_h \leq h$ .

A feltételben szereplő  $k$  helyébe  $h$ -t írva a fentiekből azt kapjuk, hogy  $d_{n-h} \geq n - h$ . Utóbbi pontosan azt jelenti, hogy legalább  $h + 1$  csúcs fokszáma legalább  $n - h$ . Mivel  $x$ -nek  $h$  szomszédja van, az előbbi  $h + 1$  csúcs között biztosan van olyan, amelyik nincs összekötve  $x$ -szel. Ezennel találtunk tehát két összekötetlen csúcsot, melyek fokszámösszege legalább  $h + n - h = n$ , ami ellentmond az Ore-tétel bizonyításánál elmondottaknak (vagy ha úgy tetszik:  $x$  és  $y$  választásának).

Ellentmondásra jutottunk, ezzel bebizonyítottuk az 1) állítást.

A 2) állítás bizonyítása:

Tegyük fel, hogy az 1)-ben szereplő feltétel nem teljesül valamely  $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$  számokra. Ez azt jelenti, hogy létezik olyan  $k < \frac{n}{2}$ , amire egyrészt  $d_k \leq k$ , másrészt  $d_{n-k} < n - k$ . Ebből következően  $d_1 \leq \dots \leq d_k \leq k, d_{k+1} \leq \dots \leq d_{n-k} \leq n - k - 1$ , és értelemszerűen  $d_{n-k+1} \leq \dots \leq d_n \leq n - 1$ . Vagyis a

$$d'_1 = \dots = d'_k = k, d'_{k+1} = \dots = d'_{n-k} = n - k - 1, d'_{n-k+1} = \dots = d'_n = n - 1$$

sorozatra teljesül, hogy  $\forall i \ d'_i \geq d_i$ . Ha tehát mutatunk egy olyan gráfot, aminek fokszámai  $d'_1 \leq d'_2 \leq \dots \leq d'_n$ , és nincsen Hamilton-köre, akkor készen vagyunk.

A következő  $G$  gráf éppen ilyen. Az  $n$ -elemű csúcshalmazt osszuk fel három részre,  $A$ -ra,  $B$ -re és  $C$ -re, ahol  $|A| = |B| = k$  és  $|C| = n - 2k$ . A  $B \cup C$  részbe eső csúcsok mindegyikét kössük össze mindegyik (ugyane  $B \cup C$ -be eső) másikkal, továbbá kössük össze valamennyi  $A$ -beli csúcsot valamennyi  $B$ -belivel. Több éle ne legyen a gráfnak. Ezzel a  $G$  gráfot teljesen megadtuk, könnyen ellenőrizhető, hogy fokszámai teljesítik a mondottakat: minden  $A$ -beli csúcs foka  $k$ , a  $C$ -belieké  $n - k - 1$ , a  $B$ -be esőké pedig  $n - 1$ . Annyit kell még megmutatnunk, hogy  $G$ -nek nincs Hamilton-köre. Ez abból látható, hogy a  $B$ -beli pontokat elhagyva a gráf  $k + 1$  komponensre esik szét: az  $A$ -beli pontokból  $k$  izolált pont lesz, a  $k + 1$ -edik komponens pedig a  $C$ -n megmaradó teljes gráf. (Fontos, hogy  $C$  biztosan nem üres halmaz, hiszen mérete  $n - 2k$ , ami a  $k < \frac{n}{2}$  feltétel miatt biztosan pozitív.)  $G$  tehát nem teljesíti a Hamilton-kör létezéséhez szükséges tanult elemi feltételt, így valóban nem lehet Hamilton-köre. Ezzel a bizonyítást befejeztük.